

El fraude de la vacuna del cáncer cervical



Alfredo Embid

Curso de medicina oriental Madrid Abril 2013

¿“Vacuna contra el cáncer de útero“?

Merck ha constatado que su eficacia para curar el cáncer de cuello del útero (cérvix) es del **0%**



La vacuna HPV – VPH virus del papiloma humano
NO es una vacuna del cáncer

El cáncer de útero ha sido atribuido a:

Actualmente ← Virus Papiloma

1970 ← Virus del herpes

1980 ← Papiloma virus

1993 ← VIH - SIDA

Y fue incluido en las enfermedades definitorias del SIDA



En los años 80 se atribuyó el SIDA a que los africanos follaban con monos (no es broma)

¿cierto o no?



iMentira!



**No
somos
racistas**

**Si pero ...
¿hay algo
mas?**




Aumentar el número de mujeres diagnosticadas de SIDA

	AMÉRICA	EUROPA	ÁFRICA
SIDA por sexo	90% varones	86% varones	50% varones
Sida por grupo de riesgo			
Homosexuales varones	62%	48%	
Drogas intravenosas	32%	33%	
Drogas inmunosupresoras no intravenosas	?	?	
Transfusiones	2%	3%	
Hemofílicos	1%	3%	
Población general	3%	13%	

¿Conoces algún virus misógeno?



Introducción del VPH como enfermedad definitoria del sida



¿Por qué?

CASOS NO TESTADOS

TEST

DEFINICIÓN DE BANGUI


RECuento DE CD 4 MENOR DE 200

1992 CASOS DE SIDA SIN VIRUS = LI CD 4



Casos de SIDA reportados antes y después de la aprobación de los inhibidores de Proteasa

1987 a 1998 EUA



Ley de FARR'S – Aumento del porcentaje de crecimiento exponencial cuando se introduce un agente nuevo patógeno en una población



INVENTAR LA EPIDEMIA



Ley fundamental en epidemiología. Gráfico presentado por Dr. Harvey Bialy. Biólogo molecular, Iª Jornadas de Medicinas Complementarias Barcelona 1993.

La teoría Oficial


Virus HPV (transmisión sexual)



Alteraciones en las células
displasia:



Cáncer cuello de útero



Virus HPV



Alteraciones en las células
Displasia (test Papanilcolau):

- CIN 1



- CIN 2




- CIN 3




Cáncer cuello de útero



Virus HPV → Ca
según el tipo de lesión



Alteraciones en las células Displasia:



No es solo de transmisión sexual

"El VPH es una infección de piel-a-piel. **No se extiende sólo mediante el sexo.** Hay múltiples informes donde queda documentado que niñas de 3, 5 o 10 años y mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales han dado positivo para los tipos de VPH que causan el cáncer".



Dra. Diane M. Harper





HPV IS SEXUALLY TRANSMITTED CANCER

Over 80 types of HPV have been identified. Some strains have been linked to cervical cancer, oral cancer, penile cancer and anal cancer. The most common HPV is a harmless type known as oral sex and oral cancer. Studies show that men are 50% more likely to develop throat and oral cancer than women. HPV is also the main cause of HPV-related oral cancers, which make up over 50% of all oral cancers. Doctors estimate that HPV is the primary cause of the estimated 3,000 cancers that are linked to the human lower tongue and upper throat. The American Cancer Society estimates that in 2006 over 9,300 women were diagnosed with cervical cancer - a 17% increase over 1999. In the United States, the most common HPV-related cancer is cervical cancer. A year, 33,000 men are diagnosed with anal cancer. HPV is the primary cause of 90% of all anal cancers. The prevalence of HPV infection in the United States is highest in the 14- to 19-year-old age group. About 21 million young people in the United States are infected with HPV. The Human Papilloma Virus (HPV) is a common sexually transmitted infection. About 80 million people in the United States currently have HPV. About 80 percent of all women and 90 percent of men who are infected with HPV will get rid of the virus within two years. The HPV virus is a major cause of several types of cancer, including cervical, anal, penile, and oral cancers.

¿"vacuna contra el cáncer de cuello de útero"?

El Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, reconoce que el virus del papiloma humano (HPV) **no provoca el cáncer** de cuello del útero directamente.

La publicidad sugiere lo contrario



El VPH NO es “la causa” del cáncer de cuello de útero

- Infección por VPH es muy frecuente en la población. En general el 75%.
- **La infección por sí sola no es suficiente para causar cáncer**





Elizabeth R. Unger PhD, MD,
entonces Jefe de la Sección de
Virus del Papiloma U. S. Centros
para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDCP)

Elizabeth R. Unger, PhD, MD
Chief, Chronic Viral Disease Branch

En la cola de la Tasa de incidencia mundial

Figura 1. Cantidad estimada de casos e incidencia de cáncer de cuello uterino²






- En España la prevalencia de infección por VPH es una de las más bajas de Europa.
- Edad media de las fallecidas:
63 años.

Infección grave por VPH

Cáncer de cuello uterino

Tasas de incidencia

Cáncer de cuello uterino. **Tasas de incidencia** por raza y grupo étnico EE. UU., 1999–2009 (raza blanca, negra, asiática/nativa de las islas del Pacífico o indoamericana/nativa de Alaska)




Cáncer de cuello uterino


Tasas de mortalidad

"El índice de mortalidad del cáncer de cuello uterino **disminuyó** en un 74% entre 1955 y 1992 y sigue disminuyendo en casi un 4% al año. Sociedad Americana del Cáncer

Cáncer de cuello uterino **Tasas de mortalidad** por raza y grupo étnico EE. UU., 1999–2009 (raza blanca, negra, asiática/nativa de las islas del Pacífico o indoamericana/nativa de Alaska). Gobierno USA / CDC



← ???



Virus HPV


Hay 100 cepas de HPV




40 producen infecciones genitales



20 pueden producir cáncer




los tipos de HPV 16 y 18
causan el
70 % de todos los cánceres
de cérvix



los tipos 6 y 11
causan el
90% de las verrugas genitales,
condilomas.

- Los tipos de riesgo del Virus del Papiloma Humano (VPH) - el 16 y el 18- apenas se dan en Estados Unidos, ni en España.
- Representan el **3,4%** de todas las infecciones del virus.



Lawrence Gostin Professor of Medicine at Georgetown University, Professor of Public Health at the Johns Hopkins University y la doctora Catherine DeAngelis -Editora Jefe de JAMA. Obligatoriedad de la VPH - Salud pública frente a salud privada- Editorial del número de mayo 2008 de la revista JAMA -el diario de la Asociación Médica Americana.



Lawrence Gostin

Otros tipos de HPV no cubiertos por la vacuna

- Varios estudios han mostrado evidencias de lesiones cancerígenas causadas por otras cepas además de HPV 16 o HPV 18.
- El estudio sobre HPV PATRICIA también encontró una alta proporción de lesiones causadas por otros tipos de HPV no cubiertos por la vacuna.


Lancet, 2007;369:2161-70.

ZERO SYMPTOMS BECAUSE HPV HAS NO SYMPTOMS, IT'S HARD TO KNOW IF YOU—OR YOUR PARTNER—IS INFECTED.


Sex is complicated enough.

HPV doesn't have to be

Find out if the HPV vaccine is right for you.



- Personas infectadas con HPV, probabilidades de desarrollar un cáncer de cérvix = 0,04 %
- De cada 10.000 personas con HPV, 4 desarrollarán cáncer de cérvix.
- Ocho veces mas que las posibilidades de ser aplastado por un asteroide.
- Las mismas de morir electrocutado por accidente.



Hay curación espontánea en la mayoría de los casos

- La inmensa mayoría de las mujeres que resultan infectadas por los virus de alto riesgo del VPH **NO** desarrollan cáncer de cérvix.
- El 90% de las personas infectadas por los distintos tipos del VPH virus del papiloma humano se ven libres de él antes de 2 años.



Virus HPV



Alteraciones en las células
displasia:



Otros factores



Cáncer cuello de útero



¿Es efectiva la vacuna?

- Ensayo llevado a cabo por la escuela médica de Dartmout, en New Hampshire.
- La vacuna era 100% efectiva para detener la infección de HPV de los tipos 16 y 18.
- Sólo había durado 27 meses.
- Esponsorizado por el fabricante Glaxo-Smithkline

(Lancet, 2004;364:1757-65)



CHARM4LIFE

Cervical cancer is real.
And your support can make a real difference.

Do your part for a good cause.
Cervical cancer can change your life—now, noted jewelry designer Carolyn Rafaelian, of Alex and Ani, joins forces with Merck & Co., Inc., to raise awareness of cervical cancer and human papillomavirus (HPV). A portion of the proceeds from this limited-edition *Charms 4 Life* bangle set will benefit the Prevent Cancer Foundation.

Do your part by knowing the facts.
Cervical cancer is caused by certain types of a virus called HPV, and if you want to help protect yourself, you should know the facts.

MORE THAN ONE TYPE OF HPV
There are more than 100 types of HPV, and most are relatively harmless. About 30 types of HPV can affect the genital area. Some types can cause cervical cancer. Other types can cause genital warts. All types of genital HPV can cause abnormal

Buy a bangle set

You are leaving this site.
The link you have selected will take you to a site outside of Merck & Co., Inc.
Merck does not review or control the content of any non-Merck site. Merck does not endorse and is not responsible for the accuracy, content, practices, or standards of any non-Merck site.

[Proceed](#) [Cancel](#)

¿Es efectiva la vacuna?

- Los resultados de estudios a largo plazo (una media de tres años) sólo fueron publicados después de que la vacuna fuera aprobada (mayo 2007).
- Ensayos- FUTURE (Female United to Unilaterally Reduce Endo-ectocervical Disease, “Mujeres unidas para reducir unilateralmente las enfermedades cervicales”) I y II.

New England Journal of Medicine (N Engl J Med, 2007;356:1915-27;1928-43).



HPV Related to
Throat/Oral Cancer

6,700 New Cases Annually
You May be at Risk. Learn about the link to HPV.

Call us at 212-241-9410 to make an appointment.

© 2011 Mount Sinai Medical Center. All Rights Reserved.

¿Es efectiva la vacuna?

FUTURE I, mostraba sólo un 20 % de efectividad, principalmente en los casos del estadio CIN 1, CIN 1 es el tipo de lesión que generalmente desaparece sin ningún tratamiento.

Gardasil: website pitch interface

Raising awareness of the human papilloma virus (HPV) lorem ipsum dolor consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt dolore magna aliquam erat volutpat.



Donate online now!

A million good people raising awareness of the human papilloma virus (HPV)

Help us raise awareness and you could win £10,000 and raise money for charity

With your help we are aiming to save thousands of pounds for charity and give you the opportunity to win £10,000. Raising awareness of the human papilloma virus (HPV) from your text or email, connective adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt dolore magna aliquam erat volutpat.

Win £10,000 and help a charity

How it works

TELL HER
raising awareness of the human papilloma virus (HPV)

1,245
Have saved so far
Get Involved

Home | What is HPV? | Reducing the risks | Downloads | Save a friend | Links and resources

SAVE SOMEONE TODAY



What is HPV?
Human papilloma virus (HPV) is the most commonly diagnosed STI in the UK.
The HPV virus can cause genital warts and cervical cancer.
In the UK, nearly 3,000 women are diagnosed with cervical cancer each year. 95% of which have the HPV virus.
Cervical cancer is the second most common cause of death by cancer after breast cancer.

Get vaccinated and stop the spread of HPV
Sed diam nonummy nibh euismod aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit. [Read more](#)

Free downloads
To get free wallpapers and screensavers. [Click here](#)

HPV IS A REAL DANGER

Help save a life
By sending an anonymous text or email to someone you care about you could help spread the awareness of the HPV virus. You could even save a life. [Click here to send a message](#)



¿Es efectiva la vacuna?

FUTURE II combinaba cuatro ensayos controlados con placebo, total de 20.583 mujeres:

- La vacuna contra 4 cepas de HPV
- 2 cepas
- 0 un placebo

Encontró un 99% de eficacia

- La reducción global de la incidencia de las lesiones en la cérvix o el cáncer en los estadios 2 y 3 de estas cepas fue sólo del 18%.

(Lancet, 2007;369;1861-8)



¿Es efectiva la vacuna?

FUTURE II

- La reducción global de la incidencia de las lesiones en la cérvix o el cáncer en los estadios 2 y 3 de estas cepas fue sólo del 18%.
- No mostraba ninguna evidencia de que la vacuna pudiera proporcionar una protección sustancial contra CIN 3, las lesiones que con más probabilidades de desarrollar cáncer.

¿Ya te Vacunaste?



VPH

La Prevención
es la Mejor Opción

¿Es efectiva la vacuna?

Un análisis de los resultados de dos estudios Fase III -Future I y Future II muestra que:

Aparecen lesiones cervicales precancerosas de cualquier tipo de VPH a los 3 años

- 3'6% de las mujeres vacunadas
- 4'4% del grupo de mujeres no vacunadas.

Drs. George F. Sawaya y Karen Smith-McCune. Editorial del New England Journal of Medicine) médicos de la Universidad de California de San Francisco (EEUU).



¿Es efectiva la vacuna?

- Lo único que la vacuna puede hacer es prevenir un pequeño porcentaje de las lesiones CIN 2, que son responsables sólo del 5% del cáncer invasivo.



1 IMPORTANCIA
La infección por el virus del papiloma humano es responsable de casi el 80% de los casos de cáncer de cuello uterino.

2 INFECCIÓN
En España, más del 80% de los menores sexualmente activos adquieren la infección por el virus del papiloma humano en algún momento de su vida.

3 FRECUENCIA
El grado de infectividad de transmisión es cada vez mayor en la etapa reproductiva.

4 CONTAGIO
El preservativo reduce, pero no evita, el contagio, por eso la vacuna es vital.

5 SINTOMATOLOGÍA
La mayoría de las infecciones del virus del papiloma humano no producen síntomas, de manera que las personas portadoras de este virus no lo saben y pueden transmitirlo a su pareja.

6 DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de la infección se hace mediante la citología vaginal, un método para la detección más importante para detectar el cáncer de cuello de útero.

7 VACINAS
La vacuna de 4 valientes, contra cuatro tipos de virus del papiloma humano 16, 18, 6 y 11, previene el cáncer de cuello uterino y los condilomas húmedos, vaginales, perianales, etc.). La vacuna bivalente, contra los tipos 16 y 18, previene el cáncer de cuello uterino.

Virus del Papiloma Humano

INDICACIÓN Y CALENDARIO VACUNAL
La indicación actual de la vacuna es la mujer en etapa de 9 a 26 años de edad. La vacunación más allá de esta edad debería ser valorada individualmente por el médico. Esta vacuna se administra en el calendario de vacunación de los menores de 11 y 12 años de edad.

3 DOSES
Son tres inyecciones: la inicial, la segunda al mes o a los dos meses (dependiendo de si es vacuna bivalente o tetravalente) y la última como refuerzo a los cinco meses de la primera. En definitiva, las tres dosis de la vacunación deben ser administradas con un intervalo de entre 6 y 12 meses.

SEGURIDAD
Contra a su malicia si nunca estuvo infectada. Es una vacuna segura y eficaz contra la infección de cuello uterino.

VPH

¿Es efectiva la vacuna?

La Dra. Karen Smith-McCune coautora de una Editorial del New England Journal of Medicine de la Universidad de California de San Francisco (EEUU) que analizó los resultados de dos estudios Fase III -Future I y Future II

Decidió

no vacunar a sus hijas adolescentes



¿Es efectiva la vacuna?

- Estudio – el HPV PATRICIA (estudios del papiloma contra el cáncer en jóvenes adultos)
- La eficacia fue significativa contra el HPV-18 solo. (Lancet 2007; 369:2161-70.



¿Es efectiva la vacuna?

Tampoco conocemos cuánto dura el efecto de la vacuna.

"Se calcula que puede ser efectiva durante cinco años como máximo pero no se sabe con seguridad."

Dra. Diane M. Harper.



todas
tendrán que
volverse a vacunar...



Dra. Diane M. Harper investigadora, médica

Profesora y directora del Grupo de Investigación Ginecológico de Prevención del Cáncer del Norris Cotton Cancer Center en la Dartmouth Medical School de New Hampshire (EEUU).

Trabajó 20 años en desarrollar la vacuna contra el VPH.

¿Estudios cuestionables?

- Los ensayos clínicos de esta vacuna sólo duraron como máximo 5 años.
- Documento de aprobación de la **FDA**:

*"Si bien el período de estudio no era lo suficientemente largo... se **"considera muy probable"** que prevenga los cánceres "*



¿Estudios cuestionables?

- Los ensayos clínicos de la vacuna Gardasil contra placebo son cuestionables.
- Ambos grupos contenían una cantidad desconocida de aluminio.



¿Estudios cuestionables?

- Los estudios se hicieron con mujeres entre 15 y 25 años.
- Nunca fue testado en chicas mas jóvenes.
- A pesar de ello el 8 de junio 2006, la Food and Drug Administration (FDA) aprobó el Gardasil para niñas desde la edad de 9 años.



¿Estudios cuestionables?

"Vacunar a una niña de once años es como permitir efectuar un gran experimento público de salud".

Dra. Diane M. Harper investigadora, médica
Profesora y directora del Grupo de Investigación Ginecológico de Prevención del Cáncer del Norris Cotton Cancer Center en la Dartmouth Medical School de New Hampshire (EEUU).

Trabajó 20 años en desarrollar la vacuna contra el VPH.



¿Es segura la vacuna?

“no hay suficiente evidencia recogida sobre los efectos secundarios como para saber que la seguridad no es un problema”.

Dra. Diane M. Harper



Dra. Diane M. Harper investigadora, médica

Profesora y directora del Grupo de Investigación Ginecológico de Prevención del Cáncer del Norris Cotton Cancer Center en la Dartmouth Medical School de New Hampshire (EEUU).

Trabajó 20 años en desarrollar la vacuna contra el VPH.



Los efectos secundarios se conocieron desde el principio

En Australia, de abril a diciembre **2007** unas 500 niñas tuvieron efectos secundarios entre ellos convulsiones y parálisis.

Natalie Tkaczuk Sikora, Le vaccin Gardasil déclenche des réactions en Australie. 4 décembre 2007.



25 casos mortales



Vaccine Adverse Effects Report System (VAERS) cumulative deaths report:

Informe de los efectos nocivos de la vacuna al sistema (VAERS) informe acumulativo de muertes – 30 de junio de 2008

8.864 casos graves de efectos indeseables

Vaccine Adverse Effects Report System (VAERS) cumulative Gardasil adverse effects report:

Informe de los efectos nocivos de la vacuna al sistema (VAERS) efectos adversos acumulativos del 30 de junio de 2008



Judicial Watch[®]

Because no one is above the law



Vaccine Adverse Effects Report System (VAERS) serious effects report
from January 1, 2008 to June 10, 2008 - 30 June 2008

- Tos
- Disnea
- Edema de faringe
- Anorexia
- Dolor de cabeza
- Insomnio
- Mialgias
- Vómitos
- Dolor inflamatorio en la piel de la región de la inyección
- Disminución de la movilidad del miembro inyectado
- Infecciones gastrointestinales
- Parálisis
- Paresia
- Sangre en la orina
- Dolor de pecho
- Escalofríos
- Micciones urgentes

Vaccine Adverse Effects Report System (VAERS) serious effects report
from January 1, 2008 to June 10, 2008 - 30 June 2008

- Náuseas
- Polaquiuria
- Pielonefritis
- Pérdida de peso
- Reacción inmediata a la inyección
- Dolor en las extremidades
- Dolor
- Mareos
- Parálisis de los ojos
- Contracción miembros de los nervios
- Quistes de mama
- Aumento de peso
- Convulsiones
- Estupor
- Fibrilación ventricular
- Hinchazón de articulaciones
- Ansiedad
- Fotofobia

Vaccine Adverse Effects Report System (VAERS) serious effects report
from January 1, 2008 to June 10, 2008 - 30 June 2008

- Enfoque distorsionado
- Temblor
- Ataxia
- Debilidad muscular
- Leucocitosis
- Leucemia mieloide crónica
- Shock anafiláctico
- Bradicardia
- Cianosis
- Sonido anormal del corazón
- Hipotensión
- Pérdida de conciencia
- Malestar
- Palidez
- Síntomas respiratorios
- Dolor musculoesquelético
- Esofagitis
- Reducción de actividad durante el día.

Algunas tendrán secuelas de por vida

FATAL FEAR

Government agencies are investigating reports of deaths and “adverse events” following injections of Gardasil, the cervical-cancer vaccine given to more than 8 million women between the ages 9 to 26. Among the cases are:

- 18 reported deaths, 10 confirmed, of women ages 11 to 22, including three New Yorkers ages 12, 17, and 18.


- 31 reports of Guillain-Barré Syndrome, an immune-system disease that causes muscle weakness and possible paralysis.

- More than 7,700 reports of various problems, including fainting, seizures, blood clots, joint pain, miscarriages.

- 4,260 ER visits and 259 hospitalizations, the longest lasting 67 days.

- 160 reports of disabling symptoms, including blurry vision, arthritis, days of vomiting and body-wide hives and welts.

Source: Vaccine Adverse Event Reporting System of FDA, CDC.



Jessica Vega, 14, of Nevada, came down with Guillain-Barré Syndrome, which paralyzed her lower legs and arms a week after her second in a series of three Gardasil shots.



Brittany LeClaire, 13, of Florida, developed headaches and lethargy leading to paralysis in her left leg after a Gardasil shot last summer.




- Judicial Watch (Vigilancia Judicial) en América descubrió en los primeros 5 meses de 2008:
 - 140 informes de casos graves (27 con tratamientos de por vida)
 - 10 abortos espontáneos
 - 6 casos del síndrome Guillain-Barré





Otros efectos adversos incluyen:

- Alteraciones del sistema linfático
- Alteraciones del sistema nervioso: ataques, mareos, dolor de cabeza, parálisis Guillain-Barré
- Dolor muscular y en articulaciones
- Shock anafiláctico
- Broncoespasmos




Síndrome de “inmunotoxicidad”

En 2006, el FDA Center for Drug Evaluation and Research organizó el IV encuentro sobre Inmunología con un grupo de ejecutivos de la compañía que fabrica la vacuna.

El grupo identificó numerosos problemas asociados con la sobreestimulación del sistema inmune como


“cytokine storm”

(J Immunotoxicol, 2008;5:33-41)



Síndrome de “inmunotoxicidad”

- “cytokine storm” (liberación de citocinas por sobreestimulación)
- Alteraciones en células y tejidos
- Síndrome de lisis tumoral (una alteración del metabolismo causante del hundimiento del ADN celular)
- Problemas **autoinmunes** incluyendo anomalías celulares y tisulares diversas.



Malformaciones congénitas

- Gardasil puede causar alteraciones congénitas en mujeres embarazadas cuando reciben esta vacuna.
- Entre las mujeres que participaron en el estudio FUTURE y que se quedaron embarazadas en el primer mes tras la vacunación, se observaron:
5 casos de alteraciones congénitas y ningún caso entre las que fueron tratadas con un placebo.



Malformaciones congénitas

Estos defectos de nacimiento incluían:

- Estenosis pilórica, (afectando al estómago e intestinos)
 - Megacolon congénito
 - Hidronefrosis (afectando a los riñones), displasia de cadera y pie torcido.
-
- Además, entre las madres vacunadas con Gardasil que amamantaron a sus hijos, éstos tuvieron más problemas respiratorios que los de las madres que recibieron un placebo.



El ministerio de sanidad mente

“El caso de las niñas valencianas, y el de otras tres menores que también experimentaron convulsiones aunque no precisaron un ingreso, es atípico ya que **no se había detectado antes** una reacción así frente a la vacuna”.

Ministerio de Sanidad 2009.



Judicial Watch en los
primeros 5 meses de
2008 los documentó

“El informe de la FDA sobre las reacciones adversas a la vacuna contra el VPH se lee como un catálogo de horrores

Cualquier estado o gobierno local ahora afectados por la campaña de cabildeo de Merck para recomendar la vacuna contra el VPH a las niñas, deberían echar un vistazo a estos informes adversos sobre la salud”.

Tom Fitton, director de Judicial Watch.

Actual ministro sanidad: Ana Mato
¿lo sabe?



Ildefonso Hernández-Aguado
Ministro de Sanidad ¿lo ha leído?




Provocar lo que se suponía debían curar

Como con otras muchas vacunas contra virus

→ A menudo conduce a un desequilibrio en la población de virus

→ Causando la proliferación de otros.



Provocan lo que se suponía debían curar

- El ensayo FUTURE II encontró que los tipos de HPV sin vacuna causaron un número bastante considerable de lesiones de grado 2 o 3.
 - La incidencia de las displasias relacionadas con HPV aumentó.
- Esto sugiere que otros tipos de HPV aprovecharon el vacío dejado por la erradicación del pequeño porcentaje de virus tipo 16 y 18 por la vacuna.

You could become one less affected by cervical cancer!



Ask your doctor about Gardasil

IMPORTANT INFORMATION ABOUT GARDASIL

GARDASIL is the only vaccine that may help guard against diseases caused by HPV Types 16 and 18, which cause 70% of cervical cancer cases, and HPV Types 6 and 11, which cause 90% of genital warts cases.

GARDASIL works when given before there is any contact with HPV Types 6, 11, 16, and 18. That's why it's important that you talk your doctor or healthcare professional about getting GARDASIL now - not later.

GARDASIL is given as 3 injections over 6 months and can cause pain, swelling, dizziness, and redness at the injection site, fever, nausea, and dizziness. Only a doctor or healthcare professional can decide if GARDASIL is right for you.



Worth 1000.com

Provocan lo que se suponía debían curar

Según la FDA los casos de displasia CIN 2 o CIN 3 debidos a los tipos de HPV no cubiertos por la vacuna habían aumentado entre aquellas mujeres que habían sido vacunadas.

Artículo de la FDA sobre la licencia de aplicaciones de Gardasil.
www.fda.gov/OHRMS/DOCKETS/ac/06/slides/2006-42228_FILES/frame.htm



Aumento de displasias - cáncer

Varios estudios han mostrado que proteger a las mujeres contra los tipos 16 y 18 de HPV pueden conducir a un aumento de displasias asociadas al HPV



Que pueden aumentar el desarrollo del cáncer



Casi el doble de displasias - cáncer

La inyección de vacunas contra el VPH en mujeres que ya tienen infecciones por VPH puede aumentar el riesgo, en un 44,6% de desarrollar lesiones precancerosas en el cuello del útero.

Herb Newborg. The Tragic Truth behind the Gardasil Nightmare. February 13, 2009.
<http://www.naturalnews.com/025613.htm>



"Creeme...
Se lo que estoy haciendo"

La medicina industrial contra la salud

Igual que otras
drogas medicamentos *
provocan la enfermedad
que se supone
debían curar



(estatinas, retrovirales, quimioterapia, psicofármacos, etc) ⁶⁰

Puede haber mas “sorpresas”

Gardasil y Cervarix son nuevas vacunas de ingeniería genética.

Nadie puede predecir qué consecuencias adversas tendrán a largo plazo.

Herb Newborg. The Tragic Truth behind the Gardasil Nightmare. February 13, 2009.
<http://www.naturalnews.com/025613.htm>




¿Cuántos efectos secundarios? ¿9.000 informes de efectos adversos y 24 muertes?

Según la el organismo oficial de efectos adversos de la vacunación VAERS de la FDA en su informe sobre efectos secundarios del Gardasil de octubre 2009 a diciembre 2011, habría habido:

14 muertes y 818 efectos adversos graves en niñas y 10 muertes y

80 eventos serios en niños y jóvenes con edades comprendidas entre 9 a 26 años.

US FDA "gardasil post licensure pediatrics safety and adverse event review"



Te parece que no es mucho?



Depende...

Si te has quedado en una silla de ruedas o si eres la madre de una de las fallecidas, seguro que no pensarás que "no es mucho"

...

Y esto solo en los dos primeros años...

¿Se informan todos los casos?



DO NOT BE ONE MORE WE HAVE NOT FULLY RECOVERED



Stormy 15 Family history of allergies
Vaccinated Feb. 11, 2007
Symptoms – body pain, fainting
headache, fainting, dizziness, nausea,
stomach pain, tingling in arms, eye pain,
and joint pain



Michelle 15 Family history
of allergies
Vaccinated July 11, 2007,
Sept. 12, 2007
Symptoms started – 1 day
Headaches, nausea,
fatigue, fevers, joint pain,
weakness



Holly 20 Family history of allergies
Vaccinated in May 2007, July 2007
Symptoms started immediately –
fainting, dizziness, nausea, weakness,
body aches,
November first seizure, brain fog
Taking seizure medication



Lydia 12 & Alana 16 Family history of allergies
Vaccinated end of July 2007, October 2007
Symptoms started November 2007
Alana – Fatigue, joint & muscle pain, abdominal pain,
difficulty breathing
Lydia – Fatigue, dizziness, headache, stomach ache,
numbness in legs, 25 lbs. weight loss



Mikaela 11 Family history of allergies
Vaccinated July 2007, September 2007, January 2007
Symptoms started in two weeks – Rash, facial
swelling, headaches, fatigue, stomach pains,
February – seizures, nausea, fainting
Thyroid problems – taking medication

Dr. Diane Harper – WFOR-TV interview “it means you must be part of a big public experiment. So we can't do that until we have more data.”

Barbara Loe Fisher – NVIC – “I think that this has caused a real crisis of trust in the hearts and minds of parents who are being more educated about vaccines and all types of products they give their children”

Make your own decision whether Gardasil is right for you.

The information is on the internet. (Gardasil side-effects)

If you are having similar symptoms go to http://health.groups.yahoo.com/group/Lets_Talk_about_Gardasil

NO

Solo se reportan el 10 % de los casos (*)

- Estos son solo los casos reportados por el VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), conocido por considerar solo un 10 % de todos los casos que existen.

Lynne McTaggart. Gardasil selling out our children. Wddty col 19 n° 8 pgnas 6-9. Nov 2008. www.wddty.com

Las cifras corregidas serian:

- 90.000 efectos adversos
- 200 muertes



(*) Sylvie Simon . La nouvelle dictature médico scientifique. Ed. Dangles 2006 Francia.. Pgnas. 47

Según la asociación de madres de niñas afectadas por las vacunas del VPH mas de 100 niñas han muerto solo en Estados Unidos y miles sufren sus efectos secundarios:

- síncope
- debilidad

- síndrome de Guillain Barré
- fatiga crónica
- dolores articulares
- convulsiones
- parálisis
- trombosis de venas profundas
- embolias pulmonares
- retrasos mentales
- accidentes cerebro vasculares
- alteraciones auto inmunes, etc.



**Que tu hija no pague por
TU IGNORANCIA**

**GARDASIL®**
Human Papillomavirus Vaccine
Types 6,11,16,18

**Cervarix®**
Human Papillomavirus Bivalent
(Types 16 and 18) Vaccine, Recombinant

¡Por fin los niños podrán disfrutar de los mismos efectos tóxicos de la vacuna que las niñas!

www.amcmh.org

¡Con la nueva vacuna “enculin” regalo de un paquete de margarina biológica!

Nueva estrategia para seguir vendiendo la fraudulenta vacuna contra el cáncer de útero

La nueva propaganda unisex de la vacuna contra el VPH la indica para los condilomas acuminados anales (una forma de verrugas genitales) causadas por algunas cepas del VPH.

El Fondo de la ONU para la población, en colaboración con Sanrio ha lanzado una campaña llamada "Hellosmile project" que consiste en utilizar el monigote de Hello Kitty, previamente introducido en las mentes de todos los niños, para vender las vacunas del VPH.



Los niños podrán disfrutar de los mismos efectos tóxicos de la vacuna que las niñas

La vacuna según las empresas resulta activa contra solo 4 cepas de VPH en el caso de los fabricantes Sanofi y Merck Sharp & Dome (MSI) y solo contra 2 cepas en el caso de Glaxo SmithKline.

De 100 cepas
40 → infecciones genitales
20 → lesión pre cancerosa
(e incluso esto es motivo de controversia).



Nueva estrategia propagandística para aumentar las ventas de la vacuna


Los clientes potenciales se amplían a los niños además de las niñas, es decir al doble y a toda la población mundial.

www.amcmh.org



*¡Gracias Merck!
¡Gracias Sanofi!*

¿Quién Gana?



Control de organismos reguladores

La FDA norteamericana aprobó la vacuna rápidamente.
La FDA recibe un 70% de su financiación de los laboratorios pese a ser una institución pública.



Los laboratorios, directamente beneficiados por las vacunaciones, financian:


Los estudios sobre su eficacia y seguridad.

La FDA encargada de evaluarlos.

Los funcionarios de los estados para que la promuevan.

Los medios de desinformación
- "científicos"
- masivos.

Encargados de hacer la propaganda.



Astra Zeneca



Medinmune (patentes)



Merck



GSK

Merck –
Sanofi – Aventis
Sanofi - Pasteur

Glaxo – Smith Kline
(+ B. Wellcome)




Gardasil



Cevarix

AstraZeneca es la dueña desde 2007 de la empresa MedImmune, fabrica la técnica para obtener las partículas que han servido para fabricar las dos primeras vacunas VPH

Fraude del Premio Nobel de Medicina



Consultores
comunes *

Financiación**

“Descubridor”
HPV ↔ Cáncer

* Bertil Fredholm, presidente del comité y Bo Angelin, miembro del comité, trabajaron para AstraZeneca.

** la Fundación Nobel, Nobel Media y Nobel Web son patrocinadas por AstraZeneca

3 Premios Nobel de Medicina a falsificadores en 2008



Harald zur Hausen por el fraude de que la causa del Cáncer de cuello del útero era el virus VPH



Françoise Barré-Sinoussi y Luc Montagnier por el fraude de que la causa del SIDA era el virus VIH

La burla de los Premios Nobel

Los de Medicina
no iban a ser menos



Unión Europea (EU) destruyó
Yugoslavia (90) y Libia 2011



Unión Europea (EU) premio
Nobel de la paz 2012.




Nuestra propuesta

¿Es eso todo?

¿Hay otros beneficios?




Aumento de la falsificación científica



Aumento de las medidas de control social

- En Estados Unidos, se intenta promulgar leyes para hacer que estar vacunado sea un prerrequisito para que los preadolescentes entren en el instituto.





Avance en la Expropiación de derechos

En Texas se decidió obligar a los padres a que todas sus hijas se vacunasen pero la decisión fue posteriormente revocada.



"This new mandatory STD vaccine shouldn't hurt a bit."

Ocultar los otros factores medioambientales del cáncer contaminación radiactiva y química



Imponer campañas de vacunación en los países “pobres” ha sido una coartada para despoblarlos



Imponer campañas de vacunación en los países “pobres” ha sido una coartada para despoblarlos

Las campañas de vacunación para la “planificación familiar” son medios para lograr la reducción de la población.

John F. May, demógrafo ya jubilado ex empleado del Banco Mundial (BM).



Vinculan las campañas de vacunación del Banco Mundial con el control demográfico. 5 oct 2012

<http://actualidad.rt.com/actualidad/view/55187-vinculan-campanas-vacunacion-banco-mundial-control-demografico>



**Imponer campañas de vacunación
en los países “pobres”
ha sido una coartada para despoblarlos**



Mas información en Afectadas por la vacuna del papiloma



“Retirar esta vacuna es invertir en salud”
<http://www.aavp.es/inicio/>

Mas información en
Boletines armas para defender la salud
www.amcmh.org

Boletín 198: Los niños podrán disfrutar de los mismos efectos tóxicos de la vacuna contra el cáncer de útero que las niñas
Alfredo Embid

Retirar la vacuna del VPH es invertir en salud

Miguel Jara

Asociación de afectadas por la vacuna del papiloma

<http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/ads198.htm>

Boletín 49: Una de las principales investigadoras del virus papiloma humano muerde la mano de sus patrocinadores revelando que las vacunas no harán gran cosa para reducir el cáncer cervical, que no se han hecho pruebas en niñas menores de 15 años y que la vacuna es más peligrosa que el cáncer del cuello del útero. Alfredo Embid

<http://www.amcmh.org/PagAMC/downloads/vacunapapiloma9.htm>

Boletín 11: El negocio de las vacunas: caso VPH Silvia Ribeiro
<http://amcmh.org/PagAMC/downloads/vacunapapiloma8.htm>

Mas información en Boletines armas para defender la salud

Boletín 8: Las empresas Meck, que fabrica la vacuna contra el VPH y Pfizer implicadas en un nuevo escándalo. Alfredo Embid.
<http://amcmh.org/PagAMC/downloads/fraudelaboratorios.htm>

Boletín 7: ¿Matarratas en las vacunas? Alfredo Embid.
<http://amcmh.org/PagAMC/downloads/vacunapapiloma7.htm>

Boletín 6: El Gardasil y el premio Nobel de medicina. Sylvie Simon
<http://amcmh.org/PagAMC/downloads/vacunapapiloma6.htm>

Boletín 5: La Vacuna del cáncer de útero ¿puede producir cáncer de útero? Alfredo Embid.
<http://amcmh.org/PagAMC/downloads/vacunapapiloma5.htm>

Boletín 4: Los casos reportados de efectos secundarios y muertes relacionadas con la vacuna HPV son solo la punta del iceberg. Alfredo Embid.
<http://amcmh.org/PagAMC/downloads/vacunapapiloma4.htm>

Mas información en Boletines armas para defender la salud

Boletín 3: La asociación Vigilancia Judicial norteamericana revela los efectos de la vacuna HPV. 8.864 casos graves de efectos indeseables y 25 casos mortales hasta el año pasado y solo en EE.UU. Alfredo Embid.

<http://amcmh.org/PagAMC/downloads/vacunapapiloma3.htm>

Boletín 2: Gardasil: engañando a nuestras niñas. Lynne Mctaggart

<http://amcmh.org/PagAMC/downloads/vacunapapiloma2.htm>

Boletín 1: Las dos primeras víctimas conocidas de los efectos secundarios de la vacuna contra virus del papiloma humano aparecen en España. Desde hace 2 años llevamos advirtiendo del riesgo de la vacuna contra virus del papiloma humano mal llamada vacuna del cáncer de cuello de útero. Alfredo Embid.

<http://amcmh.org/PagAMC/downloads/vacunapapiloma.htm>